

- Αποδεδειγμένα αξιόπιστη δραστική ουσία φιπρονίλη για γάτες και σκύλους
- Νέος και καινοτόμος μηχανισμός ανοίγματος
- Μεγάλη ευελιξία και ευκολία για το χρήστη
- Λιγότερος χρόνος και λιγότερο άγχος για τους ανθρώπους και τα ζώα κατά τη φάση της προετοιμασίας
- Υψηλή ασφάλεια για το χρήστη και το περιβάλλον
- Υψηλή ασφάλεια για τα παιδιά μέσω της συσκευασίας προστασίας για παιδιά
- Καλή ορατότητα της κόκκινης πιπέτας

Επομένως ταιριάζει πολύ καλά

- σε κτηνιάτρους που θεραπεύουν τους ασθενείς τους την ίδια στιγμή, π.χ. σε εμβολιασμό
- σε βοηθούς κτηνιάτρων που διαχειρίζονται στην πράξη την προετοιμασία
- σε ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων για χρήση στο σπίτι
 - σε νοικοκυριά με **πολλά σκυλιά**
 - σε νοικοκυριά με **σκύλους και γάτες**
 - σε νοικοκυριά με **παιδιά**

FIPROCAT σε 50 mg spot-on γάτα / FIPRODOG 67 mg spot-on μικρός σκύλος, FIPRODOG 134 mg Spot-on μεσαίου μεγέθους σκύλος, FIPRODOG 268 mg spot-on μεγάλο μεγέθους σκύλος, FIPRODOG 402 σημείο τη πολύ μεγάλου μεγέθους σκύλος.
Σύνθεση: Γάτα: Κάθε πιπέτα με 0,5 ml περιέχει: 50 mg φιπρονίλη. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,10 mg, Butylhydroxytoluene(E321) 0,05 mg. Σκύλος: Μικρού μεγέθους: Κάθε πιπέτα των 0,67 ml περιέχει 67 mg φιπρονίλη. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluene(E321) 0,067 mg. Μεσαίου μεγέθους: Κάθε πιπέτα των 1,34 ml περιέχει: 134 mg φιπρονίλη. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluene(E321) 0,134 mg. Μεγάλου μεγέθους: Κάθε πιπέτα των 2,68 ml περιέχει 268 mg φιπρονίλη. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluene(E321) 0,268 mg. Πολύ μεγάλου μεγέθους: Κάθε πιπέτα με 4,02 ml περιέχει: 402 mg φιπρονίλη. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole (E320) 0,804 mg, Butylhydroxytoluene(E321) 0,402 mg. **Εφαρμογές:** Γάτα: Για τη θεραπεία της γάτας κατά της παρασίτωσης από ψύλλους (Ctenocephalides spp.). Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 4 εβδομάδες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο. Σκύλος: Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides spp.). Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο. Αν και το προϊόν δεν έχει άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του *Demodex variabilis* και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του *Rhipicephalus sanguineus*. **Αντενδείξεις:** Γάτα: Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, να μη χορηγείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων και/ή σωματικού βάρους μικρότερου του 1 kg. Σκύλος: Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, να μη χορηγείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών και/ή σωματικού βάρους μικρότερου των 2 kg. Γάτα και Σκύλος: Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ.) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση. Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Επιπλέον Σκύλος: Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους. Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία. Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων. Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερυθρότητα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία. Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπνωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. **Με Κτηνιατρική συνταγή.** Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: IDT Biologics GmbH, Am Pharma Park, D-06861 Dessau.

FIPROCAT

FIPRODOG

Έξυπνη λύση για ψύλλους και κρότωνες*



*Γάτα: Ψύλλοι, Σκύλος: Ψύλλοι, Κρότωνοι

Η Φιπρονίλη τώρα ανοιγόμενη

... FIPROCAT και FIPRODOG, η πρωτοποριακή πιπέτα με τη λειτουργία Stand-by. Τώρα έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα για να προετοιμάσετε τον ασθενή σας με ηρεμία για την εφαρμογή της φιπρονίλης.

Με το FIPROCAT και FIPRODOG η προστασία έναντι ψύλλων και κροτώνων είναι τόσο εύκολη επειδή: η κόκκινη πιπέτα μπορεί να παραμένει ανοιχτή - για να ετοιμαστείτε εσείς και οι ασθενείς σας.



Πιπέτα στεκόμενη όρθια, με ελεύθερα τα χέρια



Αποδεδειγμένα δραστική για ψύλλους και κρότωνες



Ασφαλές για γάτες και σκύλους

Έξυπνη λύση για ψύλλους και κρότωνες

Η Φιπρονίλη είναι μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη παρασιτοκτόνος ουσία από την ομάδα του φαινυλοπυραζολών. Καταπολεμά αξιόπιστα με μακρά δράση ψύλλους και κρότωνες σε σκύλους και γάτες. Η Φιπρονίλη παρεμβαίνει στο νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων: τα παράσιτα θανατώνονται πολύ γρήγορα μετά από την ανεξέλεγκτη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος με αποκλεισμό του σύμπλοκο GABA. Είναι ήπια για γάτες και σκύλους.

Σειρά

FIPROCAT και **FIPRODOG** οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικές περιεκτικότητες, το καθένα με 3 ή 6 πιπέττες ανά συσκευασία

CAT για γάτες

S για σκύλους από 2 έως 10 kg

M για σκύλους από 10 έως 20 kg

L για σκύλους από 20 έως 40 kg

XL για σκύλους από 40 έως 60 kg

Με Κτηνιατρική συνταγή


Το FIPROCAT και FIPRODOG είναι προϊόντα φιπρονίλης με πρωτοποριακό μηχανισμό εφαρμογής: η κόκκινη Πιπέτα είναι ασφαλής και ευέλικτη στην εφαρμογή. Το FIPROCAT και FIPRODOG χορηγούνται με Κτηνιατρική συνταγή.

www.FIPROCAT-FIPRODOG.de



*Γάτα: Ψύλλοι, Σκύλος: Ψύλλοι, Κρότωνες


Ασφάλεια για τα παιδιά - μετά εύκολα




1. Κόψτε με ψαλίδι την συσκευασία προστασίας από παιδιά και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την πιπέτα από τη συσκευασία.



2. Λυγίστε το μηχανισμό στήριξης προς τα πίσω. Μη λυγίζετε από το ρύγχος πιπέτας για να ανοίξει και να ρυθμίσετε το σταγονόμετρο.



3. Τώρα έχετε χρόνο για να αναλάβετε τη φροντίδα του ζώου και του ιδιοκτήτη του. Η απόφαση είναι δική σας, για το πότε θέλετε να αναλάβετε το ζώο.



4. Επιμερίστε το τρίχωμα στην περιοχή ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Τοποθετήστε την κόκκινη πιπέτα απευθείας στο δέρμα και αδειάστε το περιεχόμενό της πατώντας επανειλημμένα. Για μεγάλα ζώα, θα πρέπει να διαιρείτε το περιεχόμενο της πιπέτας για αρκετές εφαρμογές.

