

# MELOVEM<sup>®</sup> 5 mg/ml

MELOXICAM



## Χαρακτηριστικά:

- » Το πρώτο γενόσημο ενέσιμο μελοξικάμης 5 mg/ml στην Ευρώπη
- » NSAID (ΜΣΑΦ) ενδεδειγμένο π.χ. για την ανακούφιση του μετεγχειρητικού πόνου συνδεδεμένου με χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών ιστών όπως ο ευνουχισμός.
- » Εφ' άπαξ έγχυση:
  - Χοίροι: 1 ml/12.5 kg σωματικού βάρους ενδομυϊκά
  - Μόσχοι, νεαρά βοοειδή: 5 ml/50 kg σωματικού βάρους υποδόρια
- » Χρόνοι αναμονής:
  - Χοίροι: 5 ημέρες
  - Βοοειδή: 15 ημέρες
- » Διαθέσιμο σε μπουκάλι 100 ml



**DOPHARMA**  
INTERNATIONAL  
VETERINARY PHARMACEUTICALS

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:  
Neocell ΕΠΕ, Πευκών 15, Ν.Ηράκλειο  
Τηλ.: 210 2844354, Fax: 210 2813466  
Email: [info@neocell.gr](mailto:info@neocell.gr), Web: [www.neocell.gr](http://www.neocell.gr)



# Melovem® 5 mg/ml

## ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

Melovem® 5 mg/ml

### Περιέχει ανά ml:

Meloxicam 5 mg

## ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή (μόσχοι και νεαρά βοοειδή) και χοίροι.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

### Βοοειδή:

Για χρήση σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις μαζί με την ενδεδειγμένη αντιβιοτική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή. Για χρήση σε διάρροια σε συνδυασμό με πόσιμη ενυδάτωση για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1ας εβδομάδας και νεαρά, μη-γαλακτοπαραγωγά βοοειδή.

### Χοίροι:

Για χρήση σε μη-λοιμώδεις μυοσκελετικές διαταραχές για τη μείωση των συμπτωμάτων της χλωτότητας και της φλεγμονής. Για την ανακούφιση του μετεγχειρητικού πόνου συνδεδεμένου με μικροχειρουργικές επεμβάσεις μαλακών ιστών, όπως ο ευνοχισμός.

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας. Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους ηλικίας μικρότερης των 2 ημερών.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

### Βοοειδή:

Εφάπαξ υποδόρια ένεση στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 10,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία.

### Χοίροι:

Μυοσκελετικές διαταραχές:

Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 2,0 ml/25 kg σωματικού βάρους).

Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες. Συνιστάται η δεύτερη ένεση να χορηγείται σε διαφορετικό σημείο, δεδομένου ότι η τοπική ανεκτικότητα αξιολογήθηκε μόνο μετά από εφάπαξ ένεση.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:

Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/5 kg σωματικού βάρους), πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης, με τη χρήση μιας κατάλληλα διαβαθμισμένης σύριγγας και με την προσεκτική εκτίμηση του σωματικού βάρους.

## ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου σε βοοειδή αναφέρθηκε συχνά παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο ενδέχεται να είναι επώδυνο. Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου σε χοίρους παρατηρήθηκε παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

## ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Βοοειδή : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες.

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Χοίροι : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ/ EXP) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Μπουκάλι 100 ml

Να διατίθεται μόνο με Κτηνιατρική Συνταγή.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

## ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Dopharma Research B.V.

Για τις πλήρεις πληροφορίες του προϊόντος δείτε την ΠΧΠ.

09/2012

Dopharma