

LIFE TAKERS!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ



“LIFE SAVER”
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ



THE
CARBODOTE
RANGE

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ CARBODOTE

Carbodote®
Prime

Carbodote®
Repeat

Χορηγείστε την ποσότητα του προϊόντος με την εύκολη στη χρήση σύριγγα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Το CARBODOTE PRIME θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αρχική **ΕΦΑΠΑΞ** χορήγηση.
Μια κουκίδα (●) αντιστοιχεί σε 7,8 γρ προϊόντος.

Το CARBODOTE REPEAT θα πρέπει να χορηγείται κάθε 4 - 6 ώρες για 24 ώρες, όταν απαιτείται.
Μια κουκίδα (●) αντιστοιχεί σε 7,2 γρ προϊόντος.

Βάρος ζώου (kg)	Prime	Repeat
≤ 2	1 ●	1 ●
2.1 - 4	2 ●●	2 ●●
4.1 - 6	3 ●●●	3 ●●●
6.1 - 8	4 ●●●●	4 ●●●●
8.1 - 10	5 ●●●●●	5 ●●●●●
10.1 - 12	6 ●●●●●●	6 ●●●●●●
12.1 - 14	7 ●●●●●●●	7 ●●●●●●●
14.1 - 16	8 ●●●●●●●●	8 ●●●●●●●●
16.1 - 18	9 ●●●●●●●●●	9 ●●●●●●●●●
18.1 - 20	10 ●●●●●●●●●●	10 ●●●●●●●●●●



ΣΕΙΡΑ CARBODOTE PRIME ΚΑΙ REPEAT



	ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ	SODIUM SULFATE	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΟΡΦΗ
ΒΗΜΑ 1	CARBODOTE PRIME	✓	✓	✓	✗	ΓΕΛΗ
ΒΗΜΑ 2	CARBODOTE REPEAT	✓	✗	✓	✓	ΓΕΛΗ

Το Carbodote Prime, να μη χρησιμοποιείτε σε εξωτικά κατοικίδια ζώα, λόγω του μικρού τους μεγέθους.
Όταν η χρήση του sodium sulfate δεν ενδείκνυται, το Carbodote Repeat μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

1. Study C14-2017/DPH. 2. DeClementi, C. Prevention and treatment of poisoning. In: Veterinary Toxicology. Basic and clinical principles, 3rd ed.; Gupta, R.C., Ed.; Elsevier/Academic Press; London, United Kingdom, 2018, pp.1141-1159. 3. Orisakwe O.E., and Ogbonna E. (1993). Effect of saline cathartics on gastrointestinal transit time of activated charcoal. Human Exp Toxicol; 12:403 – 405.



Neocell Ε.Π.Ε. 10° χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση
Τ.: 210 2844354, Ε: info@neocell.gr, www.neocell.gr

DP DÔMES PHARMA



THE
CARBODOTE
RANGE

CARBODOTE ΓΕΛΗ: ΑΝΟΙΞΤΕ, ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

DP DÔMES PHARMA

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ συνδυασμός δύο προγεμισμένων συρίγγων ενεργού άνθρακα, διαθέσιμος για την κτηνιατρική πρακτική



Άμεσο

- Προγεμισμένες έτοιμες σύριγγες “Ανοίγω & Χορηγώ”, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε ένα περιστατικό δηλητηρίασης άμεσα
- Προσθήκη sodium sulfate για πιο γρήγορη αποβολή τοξινών από το γαστρεντερικό σωλήνα



Δεν λερώνει

- Μια μοναδική έτοιμη μορφή ‘γέλης’, χωρίς προ-ανάμειξη και διαρροές!



Εύκολο στη χρήση

- Απλή και εύκολη χορήγηση - μετρήστε τις κουκίδες, περιστρέψτε απαλά το δακτύλιο και σπρώξτε το έμβολο
- Μία σύριγγα των 60 ml ανά 20 kg ΣΒ



Ασφαλές

- Μια σύνθεση γέλης που είναι λιγότερο πιθανό να αναρροφηθεί συγκριτικά με τις υγρές μορφές
- Τα προϊόντα Carbodote απορροφώνται μέχρι και 4,5 φορές περισσότερο από τα υπόλοιπα προϊόντα του ανταγωνισμού!



ΒΗΜΑ 1 Prime

1



Χρησιμοποιήστε το στην ΑΡΧΗ και για μια ΜΟΝΟ φορά*

Συνδυασμός ενεργού άνθρακα και sodium sulfate

Υποστήριξη για περιπτώσεις κατάποσης ανεπιθύμητων ουσιών

Διευκολύνει την αποβολή τους μέσω των κοπράνων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SODIUM SULFATE

- Βοηθάει στην απορρόφηση νερού μέσα στο λεπτό έντερο²
- Αυτό βοηθάει στην επιτάχυνση του εντερικού χρόνου διέλευσης, εξαλείφοντας την ουσία από το γαστρεντερικό σωλήνα, γρηγορότερα από ότι ΜΟΝΟ με τη χρήση ενεργού άνθρακα³

ΣΥΝΘΕΣΗ: Activated charcoal (30%), glycerine, sodium sulfate (6.25%)



ΒΗΜΑ 2 Repeat



2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

- Παρουσιάζει μια μη ειδική δυναμική προσρόφησης
- Συχνά απαιτείται επαναλαμβανόμενη χορήγηση απλού ενεργού άνθρακα, καθώς ορισμένες ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να επιμείνουν και να παραμείνουν εντός του γαστρεντερικού σωλήνα (π.χ. ως αποτέλεσμα της εντεροηπατικής ανακυκλοφορίας)

ΣΥΝΘΕΣΗ: Activated charcoal (30%), glycerine

Υποστήριξη σε περιπτώσεις κατάποσης ανεπιθύμητων ουσιών

Χορηγείτε κάθε 4 με 6 ώρες, για χρονικό διάστημα 24 ωρών

+ ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΕΑ)

Ο Ενεργός Άνθρακας (ΕΑ) επικαλύπτει το γαστρεντερικό τοίχωμα και απορροφά τις τοξίνες, μειώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητά τους στη συστηματική κυκλοφορία. Οι τοξίνες μπορούν να απορροφηθούν και να εκροφηθούν από τον ενεργό άνθρακα, επομένως είναι σημαντικό να χορηγηθεί μιας υψηλής ποιότητας ενεργός άνθρακας σε επαρκείς ποσότητες, και να χρησιμοποιηθεί μόνο καθαριστικό με την πρώτη (ή μοναδική) χορήγηση ΕΑ.

ΤΟΞΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΕΑ)		ΤΟΞΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΗ ΣΤΟΝ ΕΑ
Συνιστάται μία ΕΦΑΠΕ χορήγηση ΕΑ με sodium sulfate (Carbodote Prime)	Συνιστάται μία ΕΦΑΠΕ χορήγηση ΕΑ με Carbodote Repeat και μετά επαναληπτική χορήγηση Carbodote Repeat	Οι τοξίνες αυτές προσροφώνται ελάχιστα από τον ΕΑ. Η χορήγηση ΕΑ δεν είναι απαραίτητη εκτός και εάν υπάρχει ταυτόχρονη κατάποση τοξίνης η οποία προσροφάται από ΕΑ. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την έκθεση σε τοξίνες ή τη δυνατότητα προσρόφησης τοξινών, η χορήγηση ΕΑ θα πρέπει να θεωρείται ότι βοηθά στο καθαρισμό του γαστρεντερικού.
ACE inhibitors	Anti-coagulant rodenticides	Alcohols & sugar alcohols (xylitol, ethanol, methanol, ethylene glycol, propylene glycol)
Alliums (onion, garlic, etc.)	Aspirin	Cyanogenic plants
Alphachloralose, choralose	Atypical (second generation) anti-psychotics	Caustic detergents or corrosive items
Amphetamines	Beta-blockers (slow release formulations)	Electric batteries
Anti-histamines	Cannabis	Essential oils
Neuroleptics (first generation anti-psychotics)	Calcium channel blockers	Fertilizers
Baclofen	Cardiac Glycosides (Lily of the valley, Adenium obesum, Apocynum spp, Digitalis purpurea, Calatropis spp, Kalanchoe spp, Asclepias spp, Nerium Oleander, Ornithogalum umbellatum, Digitalis lantana, Thevatia peruviana)	Frog toxicity/Toad venom
Benzodiazepines	Chocolate	Glues and adhesives
Beta-blockers (non slow release formulations)	Cholecalciferol (VitD3)	Heavy metals (lead, zinc, copper, iron ...etc)
Brunfelsia spp	Digoxin	Hydrocarbons
Cyanobacteria (A.K.A blue-green algae)	Grapes and their dried fruits*	Oak (acorns)
Fipronil	Lillies*	Processionary caterpillars
Glyphosate	Macrocyclic lactones	Raw dough and yeast
Nicotine	Metaldehyde	Salt
Opioids	Mushrooms	Strong acids or alkalis
Plant bulbs (except Lily of the valley)	Mycotoxins	
Pyrethrin/pyrethroids	NSAIDS	
Strychnine	Organophosphates, carbamates	
SSRI/SARI (anti-depressants)	Paracetamol (acetaminophen)	
Yew tree	Phenobarbital/barbiturates	
	Phenylbutazone	
	Sago palm	
	Tacrolimus	
	Tetracyclines	
	Theophylline	
	Tricyclic antidepressants	

*Επί του παρόντος, ο τοξικός μηχανισμός είναι άγνωστος και μπορεί να εμφανιστεί μια παρατεταμένη παραμονή της τοξίνης στον γαστρεντερικό σωλήνα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΕΑ):

- Θα πρέπει να αναμεινεται μαύρο χρώμα κοπράνων
- Ο ΕΑ μπορεί να λερώσει τα υφάσματα
- Ταυτόχρονη προσρόφηση βασικών αντιδότην χορηγούμενων από το στόμα ή φαρμακευτικών σκευασμάτων ρουτίνας
- Ο ΕΑ αντενδείκνυται πριν από μια γαστρεντερική χειρουργική επέμβαση/ενδοσκόπηση ή σε διάτρηση του γαστρεντερικού
- Χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με τάση για αναρρόφηση
- Οι ασθενείς που λαμβάνουν ΕΑ, ιδιαίτερα με χρήση καθαριστικού, θα πρέπει να παρακολουθούν τους ηλεκτρολύτες τους

ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ ΕΦΑΠΕ
CARBODOTE PRIME

ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ ΕΦΑΠΕ
CARBODOTE PRIME

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ CARBODOTE REPEAT
ΚΑΘΕ 4 - 6 ΩΡΕΣ, ΓΙΑ 24 - 48 ΩΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ:

Επιταχύνουν τους χρόνους διέλευσης στο γαστρεντερικό σύστημα, επιτρέποντας την ταχεία αποβολή των τοξινών που έχουν προσροφηθεί από τον ΕΑ (μειώνοντας τη δυνατότητα για εκρόφηση τοξινών από τον ΕΑ).

Θα πρέπει να χορηγούνται ΕΦΑΠΕ, καθώς η επανειλημμένη χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση +/- διαταραχές ηλεκτρολυτών.

Η χρήση τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μαλακή ή υδαρή υφή των κοπράνων.

Αποφύγετε τη χρήση καθαρτικών σε ασθενείς με:

- Κλινική αφυδάτωση που δεν διορθώνεται εύκολα
- Διάρροια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ή υπόταση
- Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με προυπάρχουσα νεφρική ή καρδιακή νόσο
- Παρουσία γαστρεντερικής απόφραξης, διάτρησης ή ειλεού
- Με μικρό σωματικό μέγεθος, αποφύγετε τη χρήση σε εξωτικά κατοικίδια.

Σε ασθενείς όπου η χρήση καθαρτικού δεν είναι απαραίτητη, υποκαταστήστε το **Carbodote Prime** με **Carbodote Repeat**.

*Η χρήση καθαρτικών δεν συνιστάται σε ασθενείς με κλινική αφυδάτωση, υπόταση, διάρροια, γαστρεντερική απόφραξη, διάτρηση ή ειλεό και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Χρησιμοποιήστε τα με προσοχή σε ασθενείς με προυπάρχουσα νεφρική ή καρδιακή νόσο.